



LaboNews vol.11

～ 検査・輸血細胞治療部からのお知らせ～

Labo Newsは富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部ホームページから閲覧できます。

<http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/ccla/index.html>

サイボウズ掲示板「検査部から」より閲覧・印刷できます。



輸血オーダーについてのお願い

！ 輸血オーダーの締め切り日時を守ってください。

病棟、外来で使用する場合	輸血予定日の 前日
手術室で使用する場合	手術予定日の 2日前

ただし以下の血液製剤は**予約製剤**（オーダー後、血液センターに発注する）のため、締め切り日時が異なります。

濃厚血小板（PC）	輸血予定日の 前日の正午まで
抗原陰性血（不規則抗体の保有者） CMV陰性血など特殊製剤	輸血予定日の 3日前
RhD陰性血液製剤	輸血予定日の 5日前
濃厚血小板HLA	輸血予定日の 7日前

！ 以下の場合**輸血オーダー入力後、輸血細胞治療部門（内線 7790）に電話連絡**をお願いします。

- 予約製剤をオーダーする場合
- 締め切り日時を過ぎてから輸血オーダーする場合
- 血液製剤を分割する場合（分割数、使用する時間など）
- 輸血製剤の本数が10本を超える場合
- 重篤な副反応の既往がある患者の場合
- 上記以外で要連絡メッセージが出る場合
- 休日・時間外（平日17:00～8:30）に輸血オーダーする場合
（休日・時間外 ☎ 070-5064-7356）



原則、輸血オーダーは使用予定日ごとに入力をお願いします。

！ T&S の使用場所は**手術部及び血管造影室のみ**です（病棟は禁止）。

T&S（Type&Screen）とは待機手術例などの場合に、患者のABO血液型、RhD抗原、不規則抗体の有無などをあらかじめ検査しておくことで、もし緊急に輸血が必要になった場合に、**RhD陽性かつ不規則抗体が陰性であれば**15分以内に血液製剤を供給できるシステムです。これにより血液製剤の有効利用と輸血業務の効率化を図っています。

！ 輸血オーダー時に自動発生する**クロスマッチは絶対削除しない**でください。

クロスマッチ（交差適合試験）のオーダーは、その必要があるため自動発生させています。

1月中旬より、アルブミン製剤が輸血細胞治療部門での取り扱いになります。別途案内をご参照ください。

輸血オーダーについては輸血療法マニュアルに記載してあります。何か困ったことがありましたら、輸血細胞治療部門にご連絡ください（内線 7790）。



抗がん剤投与後の尿検体の提出についてのお願い

! エンドキサン、イホマイド、トレアキシンは揮発性が高いため、**抗がん剤曝露防止のため、以下のことを守って検体を提出**してください。

オーダーに関する注意事項

- ・ オーダー時、**コメントに「(抗がん剤名)投与後」と入力**してください。
- ・ 可能な限り、抗がん剤投与後、その**半減期を過ぎてから採尿**してください。

検体提出に関する注意事項

- ・ 提出に先立って、**事前に尿・一般検査部門へ連絡**してください。(内線 7757)。
- ・ **提出時刻は8:30以降**です。採尿後速やかに提出をお願いします。
(絶対に朝の検体収集時に提出しないでください)

検体の取扱いに関する注意事項

- ・ 検体の取扱いについては**以下の4点を遵守**してください。

①必ず蓋をする



②ビニール袋は二重に



③搬送は搬送用ボックスで



曝露の危険性がありますので
厳重な取り扱いをお願いします

④「(抗がん剤名)投与後」と注意書き

抗がん剤投与後の尿検体には、残余薬剤が含まれています。抗がん剤曝露により、急性症状の発現や長期的な健康への影響があります。

急性症状	長期的な影響
過敏反応(アレルギー症状) 皮膚・粘膜反応(皮膚刺激、接触性皮膚炎、咽頭痛など) 消化器症状(悪心、嘔吐など) 循環器症状(不整脈、呼吸困難など) 神経症状(頭痛、めまいなど)	悪性腫瘍の発生(発がん性) 流産 早産・低出生体重 催奇形性



その他、提出検体に注意事項がある場合や質問等あれば、尿・一般検査部門(内線 7757)にご連絡ください。

明けましておめでとうございます。
今年も皆様に有意義な情報を提供できるよう精進してまいります。
よろしくお願いたします。

